



Vous trouverez la liste des oiseaux observés sur le territoire du club ornithologique des Hautes-Laurentides après cette introduction et les définitions des statuts et des indices de fréquence d'observation.

La liste compte 282 espèces, incluant cinq espèces d'origine captive (individus échappés d'élevage). Les hybrides, tels les hybrides de Canard noir et Canard colvert, n'ont pas été retenus.

Le statut accordé à chaque espèce est basé sur l'aire de distribution de l'espèce, la présence de son habitat sur le territoire et sur les données de nidification cartographiées dans l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec pour le territoire du COHL. Lorsque la nidification d'une espèce n'a pas été confirmée, l'espèce est classée comme nicheuse si elle rencontre ces trois conditions : les Laurentides font partie de son aire de distribution, on y retrouve l'habitat dont elle a besoin pour nicher, et l'espèce fréquente la région pendant sa saison de nidification.

Les indices de fréquence d'observation sont le reflet du nombre de mentions des espèces dans la banque ÉPOQ. Pour les migrateurs de passage, les indices ont été ajustés de façon à refléter leur fréquence d'observation pendant les saisons où elles sont présentes.

## DÉFINITIONS

Statut (S)		
NM	Nicheur migrateur	Espèce présente dans les Laurentides en période de nidification, mais qui hiverne à l'extérieur de la région.
NR	Nicheur résident	Espèce présente dans les Laurentides à longueur d'année.
MP	Migrateur de passage	Espèce de passage dans les Laurentides lors des migrations annuelles entre les territoires de nidification et les aires d'hivernage.
H	Hivernant	Espèce pour laquelle la région des Laurentides constitue un territoire d'hivernage seulement.
V	Visiteur	Espèce présente loin de l'aire qu'elle occupe habituellement, par suite de divers phénomènes de dispersion.
OC	Origine captive	Espèce exotique échappée de captivité.

Indice de fréquence d'observation (F)		
c	Commun	Observé à tous les ans dans les Laurentides, habituellement en bon nombre. Relativement facile à observer sous les bonnes conditions (habitat et période).
o	Occasionnel	Observé à tous les ans dans les Laurentides. Cependant pas facile à observer, même sous des conditions favorables.
r	Rare	Jamais plus de quelques mentions par an dans les Laurentides, souvent moins. Difficile à observer en tout temps. Parfois imprévisible.
e	Exceptionnel	Totalement imprévisible. Peut ne pas être observé pendant de longues périodes (plusieurs années).
	(année)	Année de l'observation la plus récente d'une espèce exceptionnelle ayant fait l'objet de moins de 10 mentions.



Club ornithologique des Hautes-Laurentides

## ESPÈCES D'OISEAUX OBSERVÉES SUR LE TERRITOIRE DU COHL

(Mise à jour : 2018-01)

Espèce	S	F
<b>ANATIDÉS</b>		
Oie des neiges	MP	e
Bernache cravant	MP	e
Bernache de Hutchins	MP	2013
Bernache du Canada <sup>1</sup>	MP (NM)	c (o)
Cygne trompette	V	2013
Tadorne casarca	OC	1989
Canard branchu	NM	o
Sarcelle à ailes bleues	NM	e
Canard souchet	MP	e
Canard chipeau	MP	e
Canard siffleur	V	1998
Canard d'Amérique	NM	e
Canard colvert	NM	c
Canard noir	NM	c
Canard pilet	NM	e
Sarcelle d'hiver	NM	r
Fuligule à dos blanc	MP	1997
Fuligule à tête rouge	MP	e
Fuligule à collier	NM	o
Fuligule milouinan	MP	e
Petit Fuligule	MP	e
Eider à duvet	V	1985
Arlequin plongeur	V	1994
Macreuse à front blanc	MP	1996
Macreuse brune	MP	e
Macreuse à bec jaune	MP	2017
Harelde kakawi	MP	e
Petit Garrot	MP	r
Garrot à oeil d'or	NM	o
Garrot d'Islande	V	2001
Harle couronné	NM	c
Grand Harle	NM	c
Harle huppé	NM	e
Érismature rousse	V	e
<b>ODONTOPHORIDÉS</b>		
Colin de Virginie	OC	2014

Espèce	S	F
<b>PHASIANIDÉS</b>		
Perdrix choukar	OC	2012
Perdrix grise	V	2004
Faisan de Lady Amherst	OC	2013
Faisan de Colchide	OC	2003
Gélinotte huppée	NR	c
Tétras du Canada	NR	r
Tétras à queue fine	V	1996
Dindon sauvage	NR	r
<b>PODICIPÉDIDÉS</b>		
Grèbe à bec bigarré	NM	r
Grèbe esclavon	MP	e
Grèbe jougris	MP	r
<b>COLUMBIDÉS</b>		
Pigeon biset	NR	o
Tourterelle triste	NR	c
<b>CUCULIDÉS</b>		
Coulicou à bec jaune	V	1998
Coulicou à bec noir	NM	e
<b>CAPRIMULGIDÉS</b>		
Engoulevent d'Amérique	NM	e
Engoulevent bois-pourri	NM	e
<b>APODIDÉS</b>		
Martinet ramoneur	NM	o
<b>TROCHILIDÉS</b>		
Colibri à gorge rubis	NM	c
<b>RALLIDÉS</b>		
Râle de Virginie	NM	e
Marouette de Caroline	NM	e
Gallinule d'Amérique	V	1984
Foulque d'Amérique	V	2010
<b>GRUIDÉS</b>		
Grue du Canada	MP	e
<b>CHARADRIIDÉS</b>		
Pluvier argenté	MP	2017
Pluvier bronzé	MP	2002
Pluvier semipalmé	MP	2013
Pluvier kildir	NM	o

<sup>1</sup> Deux populations distinctes : les migrateurs de passage communs au printemps et à l'automne; les nicheurs migrateurs occasionnellement observés depuis quelques années.



Club ornithologique des Hautes-Laurentides

## ESPÈCES D'OISEAUX OBSERVÉES SUR LE TERRITOIRE DU COHL

(Mise à jour : 2018-01)

Espèce	S	F
<b>SCOLOPACIDÉS</b>		
Maubèche des champs	NM	2008
Combattant varié	V	1989
Bécasseau sanderling	MP	2010
Bécasseau variable	MP	2002
Bécasseau de Baird	MP	2002
Bécasseau minuscule	MP	e
Bécasseau à croupion blanc	MP	2015
Bécasseau à poitrine cendrée	MP	2004
Bécasseau semipalmé	MP	2013
Bécasse d'Amérique	NM	o
Bécassine de Wilson	NM	r
Chevalier grivelé	NM	o
Chevalier solitaire	NM	e
Petit Chevalier	MP	e
Chevalier semipalmé	V	1992
Grand Chevalier	MP	e
Phalarope de Wilson	MP	2012
Phalarope à bec étroit	V	2017
<b>ALCIDÉS</b>		
Mergule nain	V	1998
Petit Pingouin	V	2014
Guillemot à miroir	V	2001
<b>LARIDÉS</b>		
Mouette de Bonaparte	MP	e
Mouette de Franklin	V	1997
Goéland à bec cerclé	NM	c
Goéland argenté	NM	o
Goéland arctique	V	2014
Goéland bourgmestre	V	e
Goéland marin	V	e
Guifette noire	V	1996
Sterne pierregarin	NM	e
Sterne arctique	MP	1993
<b>GAVIIDÉS</b>		
Plongeon catmarin	V	2016
Plongeon huard	NM	c
<b>SULIDÉS</b>		
Fou de Bassan	V	2016
<b>PHALACROCORACIDÉS</b>		
Cormoran à aigrettes	V	e
<b>PÉLICANIDÉS</b>		
Pélican d'Amérique	V	2012

Espèce	S	F
<b>ARDÉIDÉS</b>		
Butor d'Amérique	NM	o
Petit Blongios	V	1995
Grand Héron	NM	c
Grande Aigrette	V	2014
Aigrette bleue	V	2004
Héron garde-bœufs	V	2010
Héron vert	NM	e
Bihoreau gris	V	2013
<b>CATHARTIDÉS</b>		
Urubu à tête rouge	NM	c
<b>PANDIONIDÉS</b>		
Balbusard pêcheur	NM	o
<b>ACCIPITRIDÉS</b>		
Pygargue à tête blanche	NM	o
Busard des marais	NM	r
Épervier brun	NM	o
Épervier de Cooper	NM	r
Autour des palombes	NR	e
Buse à épaulettes	NM	r
Petite Buse	NM	o
Buse à queue rousse	NM	o
Buse pattue	MP	e
Aigle royal	MP	e
<b>STRIGIDÉS</b>		
Petit-duc maculé	V	1975
Grand-duc d'Amérique	NR	e
Harfang des neiges	MP	e
Chouette épervière	MP	e
Chouette rayée	NR	r
Chouette lapone	MP	e
Hibou moyen-duc	NM	e
Hibou des marais	NM	1994
Nyctale de Tengmalm	MP	e
Petite Nyctale	NM	e
<b>ALCÉDINIDÉS</b>		
Martin-pêcheur d'Amérique	NM	c



Club ornithologique des Hautes-Laurentides

## ESPÈCES D'OISEAUX OBSERVÉES SUR LE TERRITOIRE DU COHL

(Mise à jour : 2018-01)

Espèce	S	F
<b>PICIDÉS</b>		
Pic à tête rouge	V	2004
Pic à ventre roux	V	2018
Pic maculé	NM	c
Pic mineur	NR	c
Pic chevelu	NR	c
Pic à dos rayé	NR	e
Pic à dos noir	NR	r
Pic flamboyant	NM	c
Grand Pic	NR	c
<b>FALCONIDÉS</b>		
Crécerelle d'Amérique	NM	o
Faucon émerillon	NM	o
Faucon gerfaut	MP	2017
Faucon pèlerin	NM	r
<b>TYRANNIDÉS</b>		
Moucherolle à cotés olive	NM	r
Pioui de l'Est	NM	r
Moucherolle à ventre jaune	NM	e
Moucherolle des aulnes	NM	o
Moucherolle des saules	NM	e
Moucherolle tchébec	NM	o
Moucherolle phébi	NM	c
Tyran huppé	NM	r
Tyran de l'Ouest	V	2014
Tyran tritri	NM	r
Tyran des savanes	V	2015
<b>LANIIDÉS</b>		
Pie-grièche migratrice	V	e
Pie-grièche boréale	H	r
<b>VIRÉONIDÉS</b>		
Viréo aux yeux blancs	V	2016
Viréo à gorge jaune	V	e
Viréo à tête bleue	NM	c
Viréo de Philadelphie	NM	r
Viréo mélodieux	NM	r
Viréo aux yeux rouges	NM	c
<b>CORVIDÉS</b>		
Mésangeai du Canada	NR	o
Geai bleu	NR	c
Corneille d'Amérique	NR	c
Grand Corbeau	NR	c

Espèce	S	F
<b>ALAUDIDÉS</b>		
Alouette hausse-col	NM	r
<b>HIRUNDINIDÉS</b>		
Hirondelle noire	V	2014
Hirondelle bicolore	NM	c
Hirondelle à ailes hérissées	V	e
Hirondelle de rivage	NM	r
Hirondelle à front blanc	NM	e
Hirondelle rustique	NM	o
<b>PARIDÉS</b>		
Mésange à tête noire	NR	c
Mésange à tête brune	NR	r
Mésange bicolore	V	2014
<b>SITTIDÉS</b>		
Sittelle à poitrine rousse	NR	c
Sittelle à poitrine blanche	NR	c
<b>CERTHIIDÉS</b>		
Grimpereau brun	NR	o
<b>TROGLODYTIDÉS</b>		
Troglodyte familier	NM	e
Troglodyte des forêts	NM	c
Troglodyte à bec court	V	1989
Troglodyte des marais	NM	e
Troglodyte de Caroline	V	e
<b>POLIOPTILIDÉS</b>		
Gobemouche gris-bleu	V	2007
<b>RÉGULIDÉS</b>		
Roitelet à couronne dorée	NR	c
Roitelet à couronne rubis	NM	c
<b>MUSCICAPIDÉS</b>		
Traquet motteux	V	2015
<b>TURDIDÉS</b>		
Merlebleu de l'Est	NM	o
Solitaire de Townsend	V	2005
Grive fauve	NM	c
Grive à joues grises	MP	2011
Grive de Bicknell	NM	e
Grive à dos olive	NM	o
Grive solitaire	NM	c
Grive des bois	NM	r
Merle d'Amérique	NM	c
Grive à collier	V	2010



Club ornithologique des Hautes-Laurentides

## ESPÈCES D'OISEAUX OBSERVÉES SUR LE TERRITOIRE DU COHL

(Mise à jour : 2018-01)

Espèce	S	F
<b>MIMIDÉS</b>		
Moqueur chat	NM	o
Moqueur roux	NM	o
Moqueur polyglotte	NM	e
<b>STURNIDÉS</b>		
Étourneau sansonnet	NR	c
<b>BOMBYCILLIDÉS</b>		
Jaseur boréal	H	r
Jaseur d'Amérique	NM	c
<b>PASSÉRIDÉS</b>		
Moineau domestique	NR	r
<b>MOTACILLIDÉS</b>		
Pipit d'Amérique	MP	r
<b>FRINGILLIDÉS</b>		
Pinson des arbres	V	2010
Gros-bec errant	NR	c
Durbec des sapins	NR	o
Roselin familier	NM	e
Roselin pourpré	NR	c
Sizerin flammé	H	c
Sizerin blanchâtre	H	e
Bec-croisé des sapins	NR	e
Bec-croisé bifascié	NR	o
Tarin des pins	NR	c
Chardonneret jaune	NR	c
<b>CALCARIIDÉS</b>		
Plectrophane lapon	H	2008
Plectrophane de Smith	V	1993
Plectrophane des neiges	H	r
<b>PASSERELLIDÉS</b>		
Tohi tacheté	V	2005
Tohi à flancs roux	V	2015
Bruant hudsonien	MP	o
Bruant familier	NM	c
Bruant des plaines	V	e
Bruant des champs	V	e
Bruant vespéral	NM	e
Bruant des prés	NM	o
Bruant de LeConte	MP	2011
Bruant de Nelson	V	1983
Bruant fauve	MP	r
Bruant chanteur	NM	c
Bruant de Lincoln	NM	e

Espèce	S	F
Bruant des marais	NM	o
Bruant à gorge blanche	NM	c
Bruant à face noire	V	2010
Bruant à couronne blanche	MP	o
Bruant à couronne dorée	V	2014
Junco ardoisé	NM	c
<b>ICTÉRIDÉS</b>		
Carouge à tête jaune	V	2005
Goglu des prés	NM	r
Sturnelle des prés	NM	r
Oriole masqué	V	2016
Oriole de Baltimore	NM	e
Carouge à épaulettes	NM	c
Vacher à tête brune	NM	o
Quiscale rouilleux	NM	e
Quiscale bronzé	NM	c
<b>PARULIDÉS</b>		
Paruline couronnée	NM	c
Paruline hochequeue	V	1998
Paruline des ruisseaux	NM	o
Paruline à ailes dorées	V	1996
Paruline noir et blanc	NM	c
Paruline obscure	NM	r
Paruline verdâtre	MP	e
Paruline à joues grises	NM	c
Paruline à gorge grise	MP	e
Paruline triste	NM	r
Paruline du Kentucky	V	2006
Paruline masquée	NM	c
Paruline flamboyante	NM	c
Paruline tigrée	NM	r
Paruline azurée	V	2009
Paruline à collier	NM	o
Paruline à tête cendrée	NM	c
Paruline à poitrine baie	NM	r
Paruline à gorge orangée	NM	o
Paruline jaune	NM	o
Paruline à flancs marron	NM	c
Paruline rayée	NM	e
Paruline bleue	NM	c
Paruline à couronne rousse	NM	e
Paruline des pins	NM	e
Paruline à croupion jaune	NM	c



Club ornithologique des Hautes-Laurentides

## ESPÈCES D'OISEAUX OBSERVÉES SUR LE TERRITOIRE DU COHL

(Mise à jour : 2018-01)

Espèce	S	F
<b>PARULIDÉS (suite)</b>		
Paruline à gorge jaune	V	2015
Paruline à gorge noire	NM	c
Paruline du Canada	NM	o
Paruline à calotte noire	NM	e
<b>CARDINALIDÉS</b>		
Piranga écarlate	NM	r
Cardinal rouge	NR	o
Cardinal à poitrine rose	NM	c
Passerin indigo	NM	e